



Equivalente a:

Cox-II Suspensión una gota/1 Kg de peso.

Cox-II Inyectable 1 ml/25-50 Kg de peso.

Cox-II 1 mg una tableta/5-10 Kg de peso.

Cox-II 2.5 mg una tableta/12.5-25 Kg de peso.

Cox-II 4 mg una tableta/20-40 Kg de peso.

Descripción:

Antiinflamatorio no esterooidal, analgésico y antipirético con afinidad a Cox-II

Indicaciones:

Para el tratamiento de, artritis, distensiones musculares, traumatismos y enfermedades que cursen con dolor, inflamación o fiebre. Es el tratamiento ideal para procesos inflamatorios musculoesqueléticos agudos o crónicos, trastornos osteoarticulares derivados de la osteoartritis y de la enfermedad articular degenerativa.

Especies

Caninos y Felinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Subcutánea o intravenosa lenta

Dosis:

De Inicio:

Caninos: 0.2 mg/Kg dosis única.

Felinos: 0.3 mg/Kg dosis única.

Presentaciones:

Suspensión oral, frasco con 10 mL

Inyectable, frasco con 10 mL

Caja con 30 tabletas

De Mantenimiento:

Caninos y felinos 0.1 mg/Kg cada 24 horas.