

EXPECTORANTE



LAIKA



USO VETERINARIO
VENTA SIN RECETA

EXPECTORANTE

MUCOLITICO

EXPECTORANTE

MUCOLITICO


LAIKA

LAIKA

Formula
Cloruro de Ammonio..... 2,50 g
Cloruro de Potasio..... 2,50 g
Cloruro de Sodio..... 1,00 g
Mentol..... 0,05 g
Vitaminas..... 100 mg
Especie: **Indicaciones:** Caninos y Felinos.
Via de Aplicación: Oral.
Dosis: 2-3 ml/kg.
Intervalo entre dosis: 8-12 h.
Duración del tratamiento: Según criterio
prevaleciendo el más largo para desaparecer los
síntomas.
Advertencia: No ha producido toxicidad.
Conservar a temperatura ambiente.
Contiene un 10% de alcohol.
No se debe utilizar en animales con
síntomas de insuficiencia renal.
MAYOR FARMACIA S.A.

CONTENIDO NETO: 100 ml

EXPECTORANTE

FÓRMULA	Clorhidrato de Difenilhidramina0,20 g Cloruro de Amonio 2,50 g Citrato de Sodio 1,00 g Mentol..... 0,01 g Vehículo c.s.p. 100 mL
INTRODUCCIÓN	<p>El EXPECTORANTE LAIKA es jarabe especialmente formulado de agradable sabor y excelente tolerancia para las mascotas, sus componentes principales son: la Difenilhidramina, el cloruro de amonio, el citrato de sodio y el mentol.</p> <p>La difenilhidramina posee acción antihistamínica y antialérgica, por lo cual descongestiona y permite una mayor y mejor ventilación de las vías aéreas superiores, produciendo alivio en la sintomatología tusígena espasmódica. El cloruro de amonio y el citrato de sodio, aumentan la fluidificación y facilitan la expulsión de las secreciones mucosas del tracto respiratorio. El jarabe aromático provee adecuada acción demulcente que ejerce una acción protectora local, igual que hacen las mucosidades en las membranas mucosas. Acción indispensable para el tratamiento local de gingivitis, estomatitis, faringitis, tos y en gastroenteritis.</p>
ESPECIES DESTINADAS	
INDICACIONES	Expectorante - Mucolítico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Oral.
FORMA FARMACÉUTICA	Jarabe.
DOSIS	2,5 mL/kg de peso vivo En animales menores de 2 kg: una cucharita de café (5 mL). En animales mayores a 2 kg: dos cucharitas de café (10 mL).
INTERVALO ENTRE DOSIS	Cada 6 a 12 horas.
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO	Según criterio profesional o hasta que desaparezcan los síntomas.
ADVERTENCIA	Puede producir somnolencia.
CLASIFICACIÓN	Venta bajo receta.
CONSERVACIÓN	Entre 15 y 30°C. Proteger de la luz.
PRESENTACIÓN	100 mL.

