

# TONANVIT




# LAIKA



# TONANVIT

**Tónico  
Antianémico  
Vitaminico**

<b>FÓRMULA</b>	<p>Hierro Gluconato ..... 500 mg(1)          Cobre Gluconato ..... 100 mg(2)          Magnesio Hipofosfito ..... 500 mg(3)          Vitamina B1 ..... 70 mg          Vitamina B2 ..... 10 mg          Acido Nicotínico ..... 100 mg          Vitamina B6 ..... 10 mg          Vitamina B12 ..... 20 mg          Vehículo c.s.p. .... 100 mL</p> <p>(1) Equivalente a: (1) 58 mg de Hierro (2) 14 mg de Cobre (3) 46 mg de Magnesio.</p>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<p>El <b>TÓNICO ANTIANEMICO VITAMINICO TONANVIT</b>, es una asociación ideal de los componentes del complejo B y drogas Hematínicas. Esto hace que tenga alta utilidad en clínica de pequeños animales ya que la incidencia de los estados anoréxicos , de debilidad general y anémicos es muy elevada. La anemia puede presentarse en su forma clínica, cursando con su sintomatología típica de debilitamiento general, decaimiento , palidez de mucosas , etc. o en forma subclínica como son las anemias que se detectan por cuadro hematológico. Esta forma es la de mayor incidencia produciendo retrasos en el crecimiento y respuestas insuficientes a otros tratamientos.</p> <p>Las causas mas comunes de estados de debilidad general, anemia y anorexia son:</p> <p>1- Carenciales : por carencias de Hierro, Cobre, Vitaminas B1, B2, B6, B12 y ácido nicotínico. Esto se produce en casos de dietas balanceadas, en forma insuficiente, por alteraciones en la absorción, etc</p> <p>2- Por perdidas crónicas de Sangre: parasitosis gastrointestinales, hemorragias crónicas, ectoparasitos.</p> <p>3- Enfermedades Infecciosas : en general toda enfermedad infecciosa produce estados carenciales y anemias por acción de las toxinas.</p>
<b>ESPECIES DESTINADAS</b>	
<b>INDICACIONES</b>	<p>Anemias por desnutrición, hemorragias, parasitosis, ferropriva, macrocítica y microcítica. Convalecencias, falta de apetito, desmejoramiento del estado general, preñez. En cachorros para mejorar su desarrollo.</p>
<b>VÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	<p>Oral, con jeringa dosificadora o mezclar la dosis con el alimento.</p>
<b>FORMA FARMACÉUTICA</b>	<p>Jarabe.</p>
<b>DOSIS</b>	<p>1 mL/10 kg de peso vivo. Intervalo entre dosis          Cada 12 a 24 horas.</p>
<b>INTERVALO ENTRE DOSIS</b>	<p>Cada 6 a 12 horas.</p>
<b>DURACIÓN DEL TRATAMIENTO</b>	<p>Se recomienda al menos 10 días de tratamiento.</p>
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<p>Venta libre en veterinarias.</p>
<b>CONSERVACIÓN</b>	<p>Entre 15 y 30°C. Proteger de la luz.</p>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<p>100 mL.</p>

